

4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)予防接種について

平成24年11月1日から4種混合(ジフテリア、百日せき、破傷風、不活化ポリオ)予防接種が開始となります。かかりつけの医師と相談の上、接種をしましょう。

●対象者 生後3カ月～生後90カ月(7歳6カ月)に至る間にあり、まだ規定の回数を終了していないお子さん(望ましい接種月令は、生後3カ月～18カ月)

●接種回数 初回接種3回・追加接種1回の合計4回の接種が必要になります。

●ワクチン接種による副反応
副反応としては、注射部位の発赤腫脹(はれ)、疼痛や発熱がみられることがあります。

ただし、重い副反応として非常にまれですが、アナフィラキシー(通常接種後30分以内に出現する血管浮腫・じんましん・呼吸困難などを伴う重いアレルギー反応)、けいれんがあります。

●予防接種を受けることができないお子さん

- ①明らかに発熱のあるお子さん(37.5℃を超える場合)
- ②重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さん
- ③予防接種に含まれている成分で、ひどいアレルギーを起こしたことがあるお子さん

があるお子さんがそのほか、予防接種を受けることが不適当な状態にあるお子さんが**●予防接種を受ける時、医師とよく相談しなければならぬお子さん**

- ①心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、発育障害などの基礎疾患を有するお子さん
- ②予防接種で接種後2日以内に発熱、全身性発疹などアレルギーを疑う症状が見られたお子さん
- ③過去にけいれんの既往のあるお子さん
- ④過去に免疫状態の異常を指摘されたことがある、または、近親者に先天性免疫不全症の方がいるお子さん
- ⑤予防接種に含まれている成分でアレルギーを起こす恐れのあるお子さん

●接種後の注意

- ①接種後30分程度はシヨックやアナフィラキシーが起こることが、ごくまれにありますので、医師とすぐ連絡が取れるようにしておきましょう。
- ②このワクチンの接種後、ほかのワクチンを接種する場合には、6日以上期間をあける必要がありますのでご注意ください。
- ③接種部位は清潔に保ちましょう。当日の入浴は問題ありませんが、注射部位をこすことはやめましょう。
- ④接種当日は激しい運動は避けてください。そのほかはいつも通りの生活で結構です。

●受け方

委託医療機関での個別接種となります。(下表参照)

【大田原市内の4種混合予防接種実施医療機関】

※ 受診する際は、事前に医療機関に連絡をしてください。

地区	医療機関名	所在地	電話番号
大田原	青柳医院	中央 2-1-2	(22)2122
	赤羽胃腸科外科肛門科医院	城山 2-5-29	(23)1131
	阿部内科	佐久山 2018	(28)0053
	磯外科小児科医院	浅香 3-3711-27	(22)2601
	那須赤十字病院	中田原 1081-4	(23)1122
	鎌田浅香医院	浅香 3-3-9	(22)2703
	木戸内科クリニック	美原 2-2831-153	(20)3200
	小林内科外科医院	富士見 1-1606-265	(23)8870
	高橋医院	滝沢 355	(28)1151
	高橋外科医院	住吉町 1-11-20	(22)2624
	長嶋医院	下石上 1246	(29)0050
	なす療育園	北金丸 2600-7	(20)5100
	橋本内科クリニック	元町 1-2-14	(22)2220
	藤田医院	野崎 2-7-14	(29)0010
	増山医院	小滝 1107-6	(22)2336
	湯津上	松井医院	城山 1-2-3
	吉成小児科医院	新富町 2-1-22	(22)2412
黒羽	増山医院	佐良土 861	(98)2008
	江部医院	黒羽向町 60	(54)0013
	車田医院	大豆田 457-24	(54)0062
	くろばね齋藤醫院	黒羽田町 612	(54)0031
	益子クリニック	黒羽田町 827	(54)2727

当日は、母子健康手帳(親子健康手帳)を持参し接種を受けましょう。(予診票は委託医療機関に準備してあります。)

●接種料金について 市が全額負担しますが、接種年齢を過ぎると任意接種となり、料金は自己負担となります。

■問い合わせ **東** 1階 健康政策課感染症予防係
TEL(23)8975



【お詫びと訂正】

広報おたわら 10月15日号 13ページ(健康おたわら塾)の記載内容に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫び申し上げます。

●変更
(誤) 空腹時血圧
→(正) 空腹時血糖値

■問い合わせ **東** 1階 健康政策課感染症予防係
TEL(23)8975